

ガスナインS

【本質の説明又は製造方法】

鼓脹症の治療には、主として消泡性のシリコン樹脂が多く使用されています。

本剤は、消泡作用を示すシリコン樹脂を配合した鼓脹症治療薬です。

【成分及び分量】 100mL中

| 成分 | 分量 |
|--------------|----------------------|
| シリコン樹脂エマルジョン | 30g (シリコン樹脂として9g) |

【効能又は効果】

泡沫性鼓脹症

【用法及び用量】

下記1回量を1日1～3回経口投与する。

| | 体重 | 投与量 |
|------|-----------|-----------|
| 牛 | 300kg以上 | 10～40mL |
| | 100～300kg | 5～20mL |
| | 100kg以下 | 2.5～10mL |
| 緬・山羊 | 100kg以上 | 2～8mL |
| | 30～100kg | 1～4mL |
| | 10～30kg | 0.7～2.6mL |
| | 10kg以下 | 0.4～1.6mL |

【使用上の注意】

「基本的事項」

1. 守らなければならないこと

(一般的注意)

- ・本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- ・本剤投与後、下記の期間は食用に供する目的で出荷等を行わないこと。

牛、緬・山羊:3日間

- ・本剤は獣医師の指導の下で使用すること。

(取扱い及び廃棄のための注意)

- ・小児の手の届かないところに保管すること。
- ・本剤の保管は直射日光及び高温を避けること。
- ・誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。

- ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

2. 使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

- ・皮膚に付着したときは、石けん等でよく洗うこと。
- ・誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。

(対象動物に関する注意)

- ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

「専門的事項」

(その他の注意)

- ・本剤の有効成分であるクレオソートに発がん性が認められたとする報告がある。

【使用期限】 包装に表示の使用期限内に使用すること。

【包装】 30mL×10バイアル

【製品情報お問い合わせ先】

日本全薬工業株式会社

〒963-0196 福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

フリーダイヤル 0120-452-793

受付時間 9:00-17:00(土日祝日・弊社休業日を除く)

製造販売元



日本全薬工業株式会社

ZENOAQ 福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発症に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>)にも報告をお願いします。