

ベリノール末A

【本質の説明又は製造方法】

本剤は、殺菌解毒止瀉作用をもつタンニン酸ベルベリン、乳酸菌製剤であるラクトミン、その他生薬等を配合した総合胃腸薬で、各種家畜の胃腸障害に対して、すぐれた効果を示します。

【成分及び分量】 100g中

成分		分量
主 剤	タンニン酸ベルベリン	2g
	ラクトミン	1.5g (フェーカリス菌として 3×10 ⁸ 個以上)
	延命草末	12g
	ゲンノショウコ	12g

【効能又は効果】

消化器疾患、消化器衰弱、食欲不振・下痢における症状改善、単純性下痢

【用法及び用量】

下記1回量を1日1～3回経口投与する。

	体重	投与量
牛	300kg以上	50～150g
	100～300kg	25～75g
	100kg以下	12.5～37.5g
馬	300kg以上	35～105g
	100～300kg	17.5～52.5g
	100kg以下	8.75～26.25g
豚・めん山羊	100kg以上	10～30g
	30～100kg	5～15g
	10～30kg	3.3～10g
	10kg以下	2～6g
犬	20kg以上	2.5～7.5g
	5～20kg	1.25～3.75g
	5kg以下	0.625～1.875g

【使用上の注意】

「基本的事項」

1. 守らなければならないこと

(一般的注意)

- ・本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
 - ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
 - ・本剤は獣医師の指導の下で使用すること。
- (取扱い及び廃棄のための注意)
- ・小児の手の届かないところに保管すること。
 - ・本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
 - ・誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
 - ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
 - ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

2. 使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

- ・誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。

(対象動物に関する注意)

- ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。
- ・抗菌性薬物の同時投与を避けること。

【使用期限】 包装に表示の使用期限内に使用すること。

【包装】 500g(50g×10包)

5kg(50g×100包)

5kg

【製品情報お問い合わせ先】

日本全薬工業株式会社

〒963-0196 福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

フリーダイヤル 0120-452-793

受付時間 9:00-17:00(土日祝日・弊社休業日を除く)

製造販売元



日本全薬工業株式会社

ZENOAQ 福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発症に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>)にも報告をお願いします。