

貯 法	室温保存
-----	------

動物用医薬品

承認指令書番号 17 消安第 2748 号

複合抗生物質製剤
要指示医薬品 指定医薬品 使用基準

ニューサルマイS
泌乳期乳房炎治療剤

【本質の説明又は製造方法】

本剤は、ベンジルペニシリンプロカインとジヒドロストレプトマイシン硫酸塩を配合した乳房注入用抗生物質製剤で、泌乳期の乳房炎治療に効果を示します。

【成分及び分量】 1容器(3g)中

成 分		分 量
主 剤	ベンジルペニシリンプロカイン	300,000単位
	ジヒドロストレプトマイシン硫酸塩	300mg(力価)
着色剤	青色1号	25mg

【効能又は効果】

牛：泌乳期の乳房炎

【用法及び用量】

1日1回1乳房当り本剤として以下の量を乳房内に注入する。
牛：1容器

【使用上の注意】

「基本的事項」

1. 守らなければならないこと

(一般的な注意)

- ・本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。
- ・本剤は、効能・効果において定められた適応症の治療にのみ使用すること。
- ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- ・本剤の使用に当たっては、適応症の治療上必要な最小限の期間に止めることとし、過剰にわたる連続投与は行わないこと。
- ・本剤は「使用基準」の定めるところにより使用すること。

注意：本剤は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の4の規定に基づき上記の用法及び用量を含めて使用者が遵守すべき基準が定められた動物用医薬品ですので、使用対象動物(牛)について上記の用法及び用量並びに次の使用禁止期間を遵守してください。

牛：食用に供するためにと殺する前11日間又は食用に供するために搾乳する前96時間

(取扱い及び廃棄のための注意)

- ・小児の手の届かないところに保管すること。
- ・本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。

- ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

2. 使用に際して気を付けること

(牛に関する注意)

- ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

(使用者に対する注意)

- ・誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。

「専門的事項」

(対象動物の使用制限)


- ・本剤の有効成分であるペニシリンは、過敏症反応をまれに起こすことがあるので、投与前に使用経歴や反応の有無を調べ、陽性動物には投与を避けること。

【使用期限】 包装に表示の使用期限内に使用すること。


【包装】 3gシリンジ×12本
3gシリンジ×60本

使 用 法

〔深部挿入の場合〕



〔浅部挿入の場合〕 先端部をねじり取るようにしてはずしてください。



*：ストッパーに若干切り口が残りますが乳頭への影響はありません。

注意：注入針には手を触れないでください。

【製品情報お問い合わせ先】

日本全薬工業株式会社

〒963-0196 福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

フリーダイヤル 0120-452-793

受付時間 9:00-17:00(土日祝日・弊社休業日を除く)

製造販売元

 **日本全薬工業株式会社**
ZENOAQ 福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発症に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>) にも報告をお願いします。