

鉍塩セレンクス®TZ

【成分及び分量】 1kg中

成 分	分 量
黄色酸化鉄 ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ として)	1,742mg (鉄として1,095mg)
三酸化鉄 (Fe_2O_3 として)	196mg (鉄として137mg)
硫酸銅 (CuSO_4 として)	377mg (銅として150mg)
硫酸コバルト (CoSO_4 として)	66mg (コバルトとして25mg)
硫酸亜鉛 (ZnSO_4 として)	1,235mg (亜鉛として500mg)
炭酸マンガ (MnCO_3 として)	1,046mg (マンガ (マンガンとして500mg)
ヨウ素酸カルシウムFコート ($\text{Ca}(\text{IO}_3)_2$ として)	77mg (ヨードとして50mg)
亜セレン酸ナトリウム (Na_2SeO_3 として)	33mg (セレンとして15mg)
食塩 (NaCl として)	971g (ナトリウムとして382g)

【効能又は効果】

- 無機物の補給
- 無機物欠乏による疾病の予防と治療

【用法及び用量】

自由に舐食させる。

【使用上の注意】

「基本的事項」

1. 守らなければならないこと

(一般的注意)

- 本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- 本剤は獣医師の指導の下で使用すること。

(取扱い及び廃棄のための注意)

- 小児の手の届かないところに保管すること。
- 本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

2. 使用に際して気を付けること

(対象動物に関する注意)

- 副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

「専門的事項」

(その他の注意)

- ラット胚を用いた *in vitro* 試験において、本剤の有効成分であるセレンに催奇形性が認められたとする文献報告がある。

【使用期限】 包装に表示の使用期限内に使用すること。

【包装】 5kg×4個
20kg

【製品情報お問い合わせ先】

日本全薬工業株式会社

〒963-0196 福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

フリーダイヤル 0120-452-793

受付時間 9:00-17:00 (土日祝日・弊社休業日を除く)

製造販売元(輸入発売元)

 日本全薬工業株式会社
ZENOAQ 福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

製造元

天津全薬動物保健品有限公司

(中国)

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発症に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<https://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>) にも報告をお願いします。