

ビタミン剤

ゼノビタン[®]液

鶏用経口ビタミン製剤

【本質の説明又は製造方法】

本剤は鶏の健康な発育に必須である4種の脂溶性ビタミン、5種の水溶性ビタミンをバランスよく配合しております。その中でもピリドキシン塩酸塩(VB₆)やニコチン酸アミド(ナイアシン)を豊富に配合しており、成長、産卵及び孵化率の低下等の予防に貢献します。

【成分及び分量】 100mL中

成分	分量	
主 剤	レチノールパルミチン酸エステル	1,000,000IU
	コレカルシフェロール	200,000IU
	トコフェロール酢酸エステル	1,500mg
	フィトナジオン	25mg
	リボフラビンリン酸エステルナトリウム	400mg
	ピリドキシン塩酸塩	100mg
	シアノコバラミン	2mg
	パンテノール	240mg
	ニコチン酸アミド	500mg
着色剤	赤色106号	250mg
	黄色4号	125mg

【効能又は効果】

- 脂溶性及び水溶性ビタミンの補給
- 脂溶性及び水溶性ビタミンの欠乏による疾病の予防と治療

【用法及び用量】

鶏及びうすらの飲水に添加して投与する。

通常、体重1kg当たり本剤0.05～0.3mLを1日量として投与するが、1000羽1日当たりの標準用量を、成鶏100～200mL、大雛50～100mL、中雛30～70mL、幼雛20～50mLとする。

【使用上の注意】

「基本的事項」

1.守らなければならないこと

(一般的注意)

- 本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- 本剤は獣医師の指導の下で使用すること。
- 本剤は鶏及びうすら専用なので、他の動物種には使用しないこと。

・ブローラーの出荷直前に投与すると、鶏体や消化器系(筋胃等)が赤く着色することがある。出荷直前の投与はしないこと。

(取扱い及び廃棄のための注意)

- ビタミンAは、アルカリ性、日光によって急速に分解する。飲水への混和は使用時に行うこと。
- 小児の手の届かないところに保管すること。
- 本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
- 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- 使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- 本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

2.使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

- 誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。
- (鶏及びうすらに関する注意)
- 副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

「専門的事項」

(副作用)

- ビタミンAは、過量投与によるビタミンA過剰症(皮膚の変色、骨の肥大性増殖等)が起こることが報告されている。
- ビタミンDは、過量投与による中毒症(骨の脱カルシウムと軟組織化骨)が殆ど全ての動物種で報告されている。
- 鶏、七面鳥においてビタミンE大量投与下(30、150mg/kg)で、ワクチン等による抗体産生能が低下するとの報告がある。

【使用期限】 包装に表示の使用期限内に使用すること。

【包装】 20Lバグインボックス

【製品情報お問い合わせ先】

日本全薬工業株式会社

〒963-0196 福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

フリーダイヤル 0120-452-793

受付時間 9:00-17:00(土日祝日・弊社休業日を除く)

製造販売元

 **日本全薬工業株式会社**
ZENOAQ 福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発症に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>) にも報告をお願いします。