

カンメルブルー(L)

【成分及び分量】 100mL中

成分		分量
主 剤	サリチル酸メチル	4g
	l-メントール	3g
	dl-カンフル	2g
着色剤	青色1号	5mg

【効能又は効果】

筋炎、関節炎、神経炎、腱炎、腱鞘炎、靭帯炎、打撲、捻挫

【用法及び用量】

適宜家畜の患部に適量を塗布する。

【使用上の注意】

「基本的事項」

1. 守らなければならないこと

(一般的注意)

- ・本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- ・本剤は獣医師の指導の下で使用すること。
- ・本剤は家畜以外に使用しないこと。

(使用者に対する注意)

- ・使用した後又は皮膚に付着したときは、石けん等でよく洗うこと。

(取扱い及び廃棄のための注意)

- ・本剤の外観又は内容に異常を認めたものは使用しないこと。
- ・火気の付近では使用しないこと。
- ・開封後は早めに使い切ること。
- ・使用後の容器を火中に投じないこと。
- ・小児の手の届かないところに保管すること。
- ・本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
- ・誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

2. 使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

- ・誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。
- ・本剤の使用時にはゴム手袋等を着用することが望ましい。

- ・目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。

(対象動物に関する注意)

- ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。
- ・目の周囲、粘膜、湿疹、かぶれ、傷口又は化膿している患部には使用しないこと。
- ・本剤は外用以外に使用しないこと。
- ・妊娠動物及び妊娠している可能性のある動物に使用する際は獣医師に相談し、使用の是非を判断すること。

「専門的事項」

(その他の注意)

- ・本剤の有効成分であるサリチル酸メチルは、経口又は腹腔内投与によるラットの動物実験で催奇形作用が報告されている。
- ・本剤の有効成分であるサリチル酸メチルは、実験動物において変異原性を示したとの報告がある。

【使用期限】 包装に表示の使用期限内に使用すること。

【包装】 500mLプラスチック容器

5Lプラスチック容器

【製品情報のお問い合わせ】

日本全薬工業株式会社

〒963-0196 福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

フリーダイヤル 0120-452-793

受付時間 9:00-17:00(土日祝日・弊社休業日を除く)

製造販売元



日本全薬工業株式会社

ZENOAQ 福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

危険物第四類	
第一石油類	
カンメルブルー(95vol%エタノール含有)	
数量：500mL	
危険等級Ⅱ	水溶性

火気厳禁

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発症に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>)にも報告をお願いします。

カンメルブルー(L)

【成分及び分量】 100mL中

成分		分量
主 剤	サリチル酸メチル	4g
	l-メントール	3g
	dl-カンフル	2g
着色剤	青色1号	5mg

【効能又は効果】

筋炎、関節炎、神経炎、腱炎、腱鞘炎、靭帯炎、打撲、捻挫

【用法及び用量】

適宜家畜の患部に適量を塗布する。

【使用上の注意】

「基本的事項」

1.守らなければならないこと

(一般的注意)

- ・本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- ・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- ・本剤は獣医師の指導の下で使用すること。
- ・本剤は家畜以外に使用しないこと。

(使用者に対する注意)

- ・使用した後又は皮膚に付着したときは、石けん等でよく洗うこと。

(取扱い及び廃棄のための注意)

- ・本剤の外観又は内容に異常を認めたものは使用しないこと。
- ・火気の付近では使用しないこと。
- ・開封後は早めに使い切ること。
- ・使用後の容器を火中に投じないこと。
- ・小児の手の届かないところに保管すること。
- ・本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
- ・誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

2.使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

- ・誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。
- ・本剤の使用時にはゴム手袋等を着用することが望ましい。

- ・目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。

(対象動物に関する注意)

- ・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。
- ・目の周囲、粘膜、湿疹、かぶれ、傷口又は化膿している患部には使用しないこと。
- ・本剤は外用以外に使用しないこと。
- ・妊娠動物及び妊娠している可能性のある動物に使用する際は獣医師に相談し、使用の是非を判断すること。

「専門的事項」

(その他の注意)

- ・本剤の有効成分であるサリチル酸メチルは、経口又は腹腔内投与によるラットの動物実験で催奇形作用が報告されている。
- ・本剤の有効成分であるサリチル酸メチルは、実験動物において変異原性を示したとの報告がある。

【使用期限】 包装に表示の使用期限内に使用すること。

【包装】 500mLプラスチック容器

5Lプラスチック容器

【製品情報お問い合わせ先】

日本全薬工業株式会社

〒963-0196 福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

フリーダイヤル 0120-452-793

受付時間 9:00-17:00(土日祝日・弊社休業日を除く)

製造販売元



日本全薬工業株式会社

ZENOAQ 福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

危険物第四類	
第一石油類	
カンメルブルー(95vol%エタノール含有)	
数量：5 L	
危険等級Ⅱ	水溶性

火気厳禁

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発症に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>)にも報告をお願いします。