

## 子宮収縮剤

要指示医薬品 指定医薬品

## 動物用オキシトシンA注射液

## 【本質の説明又は製造方法】

本剤は、1アンブル(5mL)中に合成オキシトシンを50オキシトシン単位含有する水性注射剤です。

本剤は子宮平滑筋に対し直接作用し、強い律動的な収縮を起こします。特に子宮の感受性が高まっている妊娠時の末期及び分娩直後には強く作用します。また本剤は授乳中の動物の乳管洞平滑筋を収縮させ射乳を促します。このため、陣痛微弱、射乳促進等に有効です。なお、本剤の作用は卵胞ホルモンにより増強し、黄体ホルモンにより抑制されます。

## 【成分及び分量】 本品1アンブル(5mL)中

| 成分     | 分量         |
|--------|------------|
| オキシトシン | 50オキシトシン単位 |

## 【効能又は効果】

牛：陣痛微弱、子宮脱、胎盤停滞、ミイラ変性胎児の排出、射乳促進

馬：陣痛微弱

豚：陣痛微弱、射乳促進

犬：陣痛微弱

猫：陣痛微弱

## 【用法及び用量】

通常1日1回1頭当たり下記の量を静脈内、筋肉内又は皮下に注射する。

牛：20～150単位

馬：20～150単位

豚：20～50単位

犬：5～30単位

猫：5～30単位

## 【使用上の注意】

## 「基本的事項」

## 1. 守らなければならないこと

(一般的注意)

・本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。

・本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。

・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。

(取扱い及び廃棄のための注意)

・注射器具は滅菌されたものを使用すること。

- ・本剤はエタノールによって効力が低下するので、注射筒は煮沸滅菌すること。
- ・小児の手の届かないところに保管すること。
- ・本剤の保管は直射日光、高温及び凍結を避け、冷所で保存すること。
- ・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- ・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- ・使用済みの注射針は、針回収用の専用容器に入れること。針回収用の容器の廃棄は、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を有した業者に委託すること。

## 2. 使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

・妊娠中の女性に、投与作業を行わせないこと。

・誤って注射された者は、直ちに医師の診察を受けること。

(対象動物に関する注意)

・副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

## 「専門的事項」

(対象動物の使用制限等)

・本剤は、妊娠等により子宮頸管が緊縮している場合には投与を避けること。

(重要な基本的注意)

・本剤を静脈内注射する場合には、緩徐に注入すること。

【使用期限】 包装に表示の使用期限内に使用すること。

【包装】 5mL×10管

## 【製品情報のお問い合わせ】

日本全薬工業株式会社

〒963-0196 福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

フリーダイヤル 0120-452-793

受付時間 9:00-17:00(土日祝日・弊社休業日を除く)

製造販売元



日本全薬工業株式会社

ZENOAQ 福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発症に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>)にも報告をお願いします。